

Gentil F.

RST/IFREMER/DYNECO/AG/10-24/REBENT

Résultats de la surveillance du Benthos

Région Bretagne

> Suivi stationnel des sables sublittoraux pour l'année 2009



Édition 2009



Coordination

 **ifremer**

www.rebent.org

AVANT PROPOS

Le REseau de surveillance BENThique (REBENT), a été créé en réponse aux besoins croissants de connaissance et de suivi de la biodiversité marine côtière pour évaluer l'impact des activités humaines ou du changement climatique, et contribuer aux mesures de gestion ou de protection des milieux naturels. Il a pour objectifs d'acquérir une connaissance pertinente et cohérente des habitats marins benthiques côtiers, et de constituer un système de veille pour détecter les évolutions de ces habitats, à moyen et long termes, notamment pour ce qui concerne la diversité biologique. Ce réseau se propose aujourd'hui d'encadrer au niveau national les actions de surveillance déclinées régionalement notamment la DCE.

La Bretagne constitue la région Pilote. Sur cette région, après une phase d'avant-projet (2001-2002), la stratégie opérationnelle mise en œuvre depuis 2003 englobe un inventaire régional d'habitats, des cartographies des habitats sur des secteurs de référence, le suivi de la dynamique spatiale du couvert végétal et le suivi de la diversité végétale et animale. Coordonné par Ifremer, ce réseau associe sur la région Bretagne de nombreux partenaires scientifiques et techniques : l'Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) de Brest, le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), la station de Concarneau, la Station Biologique de Roscoff, le Laboratoire de Géomorphologie (EPHE/CNRS) de Dinard, le Centre d'Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA) de Pleubian), les départements DYNECO et LER d'IFREMER.

Le Rebent Bretagne a bénéficié d'un financement exceptionnel décidé en CIADT, du soutien financier de la Région Bretagne qui s'inscrit à partir de l'année 2007 dans le cadre du CPER ainsi que d'un financement de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne pour les prélèvements concernant l'application de la Directive Cadre Eau (DCE).

Les suivis de la biodiversité ont été mis en place sur une sélection d'habitats comprenant des habitats remarquables et des habitats largement représentés : dans la zone de balancement des marées, ils concernent en particulier les sédiments fins, les herbiers et certains types de zones rocheuses ; dans les petits fonds, il s'agit des sables fins, des bancs de maërl et de certains types de fonds rocheux suivis en plongée. Chaque habitat est placé sous la responsabilité thématique d'un laboratoire ; il est échantillonné régulièrement, selon un protocole adapté dans des lieux de surveillance répartis le long du littoral. A partir de 2007, la stratégie d'échantillonnage retenue tient compte des contraintes définies pour le contrôle de surveillance DCE.

Les informations produites se présentent sous la forme de fiches techniques, précisant les protocoles mis en œuvre, de fiches descriptives pour les lieux de surveillance, de bulletins, visant à communiquer annuellement les résultats sous une forme graphique facile à lire, de rapports d'études pour la cartographie sectorielle et de données (stockées sous une forme intermédiaire en attendant la saisie directe dans la base Quadrige², aujourd'hui opérationnelle). Les premiers bulletins établis sur la région Bretagne (édition 2005) ont été présentés dans le cadre des journées Rebent 2006. Cette nouvelle édition complète dans l'espace et dans le temps les séries temporelles déjà entamées et permet de mieux appréhender la variabilité à l'échelle régionale.

Pour plus d'information, vous retrouvez sur le site du réseau Rebent (<http://www.rebent.org/>), l'ensemble des documents mis en forme. Ces informations peuvent être librement téléchargées et utilisées, sous réserve de citation.

Touria Bajjouk
Coordination Rebent-Bretagne

SOMMAIRE

AVANT PROPOS	1
SOMMAIRE	2
1.- Présentation des acteurs	3
2.- Présentation générale de l’habitat des sables fins sublittoraux et de la stratégie du suivi	4
3.- Résultats de surveillance	9
3.1.- Documentation des figures	9
3.1.1.- Granulométrie	9
3.1.2.- Matière organique	11
3.1.3.- Richesse spécifique et Abondance	12
3.1.4.- Groupes écologiques et coefficient benthique	15
3.1.5.- Les groupes trophiques	17
3.2.- Analyse sédimentologique pour l’année 2009	20
3.2.1.- Analyse granulométrique	20
3.2.2.- Matière organique	23
3.3.- Composition spécifique pour l’année 2009	24
3.4.- Richesse spécifique et Abondance pour l’année 2009	25
3.4.1.- Richesse spécifique	25
3.4.2.-Abondance	26
3.5.- Structure écologique pour l’année 2009	28
3.6.- Structure trophique pour l’année 2009	29
4.-Commentaires généraux	30
Références bibliographiques	33

1.- Présentation des acteurs

Touria BAJJOUK (IFREMER/DYNECO/AG)	Coordination Rebent Bretagne
Franck Gentil (Station Biologique de Roscoff)	Responsabilité scientifique, expertise taxonomique, rédaction
Caroline Broudin (Station Biologique de Roscoff)	Analyse en laboratoire, expertise taxonomique
Jacques Grall (Observatoire IUEM) Marion Maguer (LEMAR)	Prélèvements terrain (mission REBENT Côtes de la Manche 2009)
Renaud Michel (Station Biologique de Roscoff)	
Caroline Broudin (Station Biologique de Roscoff)	

2.- Présentation générale de l'habitat des sables fins sublittoraux et de la stratégie du suivi

La Bretagne possède un important linéaire de près de 3 000 km de côtes très découpées, d'une grande variété, alternant milieux sableux et rocheux, côtes basses, falaises, rias, estuaires, baies ouvertes. Globalement, on considère que le littoral breton est constitué d'à peu près 40% de milieux sableux, 30% de milieux rocheux, et 30% de marais et vasières.

Les fonds marins autour de la Bretagne sont caractérisés par une opposition entre deux entités géomorphologiques : la Manche occidentale et la mer d'Iroise d'une part, et le secteur Nord-Gascogne d'autre part.

Ainsi combinant cette variété géomorphologique et des situations marines contrastées, les côtes nord-bretonnes, marquées par les forts courants de marée de la Manche, s'opposent à celles du Sud-Bretagne où l'hydrodynamisme océanique est dominant par rapport au phénomène de la marée.

De ces particularités des côtes bretonnes résulte la grande variété en milieux abritant une forte diversité biologique (végétale et animale).

Les travaux d'exploration à grande échelle des fonds côtiers et du plateau continental autour de la Bretagne (Cabioch, 1961, 1968 ; Glémarec, 1964, 1969 ; Retière, 1979 ; Toulemont, 1972) ont décrit les peuplements macrobenthiques et montré que leur répartition est largement tributaire des conditions écologiques abiotiques comme l'hydrodynamisme, la granulométrie, les paramètres physico-chimiques de l'eau, ... On sait ainsi que la présence des fonds de sables fins propres ou envasés est liée à un hydrodynamisme modéré des courants de marée, et qu'ainsi en Manche, les côtes françaises sont caractérisées par la présence de surfaces limitées et discontinues de sédiments sableux essentiellement cantonnés dans les zones abritées comme les fonds de baie (Cabioch *et al.*, 1977 ; Gentil & Cabioch, 1997, ...). Ici encore, on peut noter une différence nette entre les côtes nord et sud de la Bretagne : les fonds de sables fins largement répandus sur les côtes sud (Glémarec, 1969 ; Menesguen, 1980) opposés aux rares unités de sables fins pour les côtes nord (Cabioch, 1968 ; Gentil & Cabioch, 1997).

Dans le schéma général de répartition des peuplements macrobenthiques du plateau continental nord-européen (Glémarec, 1973), les fonds sédimentaires (depuis les vases jusqu'aux cailloutis), et spécialement les fonds sablo-vaseux occupent une place particulière en raison de leur importance vis à vis de nombreuses activités halieutiques.

En effet, l'activité humaine montre un impact non négligeable sur les peuplements des sables fins sublittoraux. Par exemple, la pêche au chalut a de nombreuses conséquences, comme la remise en suspension dans l'eau de particules fines ou la destruction d'espèces benthiques pouvant aller jusqu'à leur disparition (exemple de *Pinna rudis* dans le golfe de Gascogne (Glémarec, 1978).

La prise en compte des peuplements sublittoraux de sables fins plus ou moins envasés s'impose pour plusieurs raisons (Guillaumont *et al.*, 2001) :

- ce sont des formations sédimentaires typiques des environnements côtiers sous la dépendance d'un hydrodynamisme relativement faible permettant une sédimentation des particules fines (pélites); ainsi l'hydrodynamisme a une influence directe sur la granulométrie, particulièrement sur la proportion de pélites (particules de taille inférieure à 63µm), ce qui sera déterminant pour la nature du sédiment et par conséquent pour la composition du peuplement qui lui est associé,

- l'anthropisation des zones côtières conduit souvent à des apports de matière organique sous forme particulaire, directement (par des effluents et par les arrivées estuariennes), ou indirectement (par eutrophisation des eaux amenant des développements de producteurs primaires), particules qui vont se déposer près des côtes sur ces fonds à sédimentation fine,
- ces peuplements sont bien connus pour abriter une diversité spécifique élevée associée à de fortes biomasses,
- la sensibilité particulièrement nette de ces peuplements vis à vis de la contamination pélagique ou de l'enrichissement en matière organique s'exprime par des changements structuraux et fonctionnels : en termes d'espèces (espèces sensibles qui vont disparaître ou régresser, espèces opportunistes qui vont s'installer ou proliférer, ...), en termes de biomasses, de guildes trophiques. Depuis quelques années, des indicateurs de la qualité du milieu pour ces peuplements de sédiments fins sont proposés à partir de ces changements structuraux et fonctionnels (Grall & Glémarec, 1997; Borja *et al.*, 2000).

La sélection des sites pour le suivi stationnel des sables fins sublittoraux a été d'abord faite en essayant de répartir régulièrement des sites autour de la Bretagne en fonction de la présence de ces sédiments, puis en considérant les différents paramètres abiotiques et « anthropiques » qui régissent ce type de milieu. Enfin pour déterminer localement les localisations des stations, il a été tenu compte des données anciennes ou des suivis déjà en cours.

Sur les dix secteurs primitivement sélectionnés autour de la Bretagne, neuf ont pu effectivement être échantillonnés dès 2004, ce sont du nord au sud (voir la carte : figure 1) : La baie de Saint-Brieuc, la baie de Lannion, la rade de Brest, la baie de Douarnenez, la baie d'Audierne, la baie de Concarneau, Lorient, la baie de Quiberon et la baie de Vilaine.

Le secteur Baie du Mont Saint Michel n'a pu être retenu en raison de l'absence de sédiments fins non impactés par les proliférations de crépidules (les sédiments fins y sont essentiellement représentés par des faciès de sédiments hétérogènes envasés : voir Augris & Hamon, 1996 ; Noël *et al.*, 1995).

En complément de ces neuf secteurs, se rattache le secteur de la baie de Morlaix (avec deux sites différents : Pierre Noire et Rivière de Morlaix) qui fait déjà l'objet d'un suivi benthique à long terme depuis 1977 (Dauvin, 1979, 1984, 1996 ; Gentil, 2000) et dont on présentera les données 2008 correspondant aux sables fins envasés de Pierre Noire.

Pour l'année 2007, quatre sites supplémentaires (du nord au sud : Iroise, Douarnenez Port, Baie de Vilaine Large 1, Baie de Vilaine Large 2) ont été échantillonnés. Leur sélection a été réalisée en procédant comme pour les dix sites références (données sédimentaires et historiques).

La campagne d'échantillonnage 2009 a eu lieu entre le 20 février et le 1^{er} mars 2009 : tous les secteurs ont pu être échantillonnés.

Ce sont donc au total les résultats pour l'année 2009 concernant dix secteurs autour de la Bretagne qui sont présentés.




Figure 1.- Localisation des secteurs retenus pour le suivi des sables fins sublittoraux.

Méthodologie

Une fiche technique « échantillonnage quantitatif des biocénoses subtidales des fonds meubles » a été mise au point en 2003 (Hily & Grall, 2003 : FT01-2003-01 sur le site REBENT) ; elle sera retenue pour le suivi stationnel des peuplements sublittoraux des sables fins envasés. Suivant les recommandations issues de l'APS (Guillaumont et al, 2001), la variabilité spatiale est appréhendée en considérant trois stations peu éloignées les unes des autres dans chaque site, avec 3 réplicats (= prélèvements) pour chaque station (figure 2).

Le protocole d'échantillonnage de la Baie de Morlaix est différent de celui mis en œuvre dans le cadre du programme Rebent (10 bennes pour l'étude de la macrofaune et une pour l'étude sédimentaire).




Figure 2 : principe de répartition des répliquats (= prélèvements) par station, et des stations pour chaque site sélectionné. (Numérotation : XA1-3, XB1-3, XC1-3)

Travail en mer :

Les prélèvements (répliquats) se font à l'aide de la benne Smith & McIntyre (surface d'échantillonnage de 0,1m²). Le contenu de chaque benne est tamisé sur une maille ronde de 1 mm de diamètre. Puis le refus est conservé individuellement dans une solution salée et neutralisée à 10% de formol, en attendant d'être trié en laboratoire.

Pour chaque station, un échantillon supplémentaire est effectué pour les analyses sédimentaires et les mesures de matière organique. Le sédiment ainsi prélevé, est stocké au congélateur pour être analysé ultérieurement.

Travail au laboratoire :

Après coloration au rose Bengale, la macrofaune de chaque prélèvement est triée, puis identifiée jusqu'à l'espèce dans la mesure du possible.

Pour chaque espèce ou groupe taxonomique, des mesures de biomasse sont réalisées selon le protocole suivant (Crisp, 1984) : après un passage à l'étuve (48h à 80°C), le poids sec avec cendres (PS) est déterminé avec une balance de précision. Chaque échantillon passe ensuite au four (6h à 520 °C), ce qui permet de mesurer le poids sec de cendres (PSC). La différence entre les deux mesures obtenues (poids sec avec cendres – poids sec de cendres) permet de calculer le poids sec libre de cendre (PSLC) :

$$\text{PSLC} = \text{PS} - \text{PSC} \text{ en grammes}$$

Pour l'étude granulométrique, les échantillons (une fois décongelés) séjournent 48h à l'étuve à 80°C, puis sont pesés avant d'être lavés à l'eau douce sur un tamis de maille 63µm, et ensuite à nouveau séchés à l'étuve à 80°C pendant 48h, et sont pesés une nouvelle fois. Cette manipulation permet d'estimer le taux de pélites (particules de taille inférieure à 63µm) par différence entre le poids sec avant lavage et le poids sec après lavage.

A la suite, le sédiment, une fois lavé et séché, passe sur une colonne de tamis AFNOR. Chaque fraction obtenue est ensuite pesée avec une balance de précision.

Pour chaque fraction granulométrique, les résultats bruts sont exprimés en pourcentage pondéral de l'échantillon de départ.

Pour les mesures de matière organique (Buchanan, 1984) , le sédiment est séché à l'étuve pendant 48h à 80°C, pesé puis passé au four à 520°C pendant 6h, et les résidus sont pesés. La différence entre les deux mesures obtenues (poids sec total – poids sec des résidus) permet d'estimer la fraction de matière organique présente dans l'échantillon de sédiment.

Les résultats sont exprimés en pourcentage pondéral de l'échantillon de départ.

3.- Résultats de surveillance

3.1.- Documentation des figures

3.1.1.- Granulométrie

Pour chaque site, trois échantillons sont prélevés à raison d'un par station afin d'obtenir une valeur moyenne (et écart-type) par site échantillonné.

Chaque échantillon de sédiment analysé subit le traitement décrit dans la partie méthodologie.

Après passage sur la colonne de tamis AFNOR, chaque fraction recueillie et pesée est exprimée sous forme de pourcentage de la masse totale de sédiment analysé. En considérant une ou plusieurs fractions, on peut ensuite définir plusieurs catégories sédimentaires suivant la classification adoptée par Larssonneur (1971, 1977) et Vaslet *et al.* (1975) (tableau 1).

Tableau 1. Catégories sédimentaires adoptées en fonction du maillage des tamis AFNOR utilisés, et correspondance en unités phi Φ (d'après Larssonneur, 1971, 1977 ; Vaslet *et al.*, 1975) .

Diamètre maille (μm)	unités Φ	catégories sédimentaires
2000	-1	graviers et cailloux
1250	-0,32	sables grossiers
1000	0	
500	1	sables moyens
315	1,67	sables fins
200	2,32	
125	3	sables très fins
100	3,32	
90	3,48	sablons
63	3,99	pélites
40	4,64	

Les résultats obtenus sont présentés sous forme de graphiques combinés (figure 3) : en abscisses, le diamètre des grains est exprimé en unités micrométriques (μm) et en unités Phi (Φ), où $\Phi = -\text{Log}_2 [\text{diamètre de la maille du tamis (en } \mu\text{m})]$.

La contribution de chaque fraction au poids total est exprimée sous forme d'histogramme, complété par une courbe cumulée des pourcentages pondéraux (figure 3).

Exemple d'illustration des résultats obtenus par l'analyse granulométrique des sédiments :




Figure 3 : Courbe granulométrique en pourcentage pondéral cumulé, et histogramme des pourcentages de chaque fraction en fonction des unités Φ et du diamètre du tamis (μm). Détermination graphique des quartiles (Q1 et Q3) et de la médiane (Md = Q2).

- 1** : Titre du graphique : site et année considérée
- 2** : Axe principal des ordonnées (histogramme des pourcentages du poids total analysé)
- 3** : Axe secondaire des ordonnées (courbe cumulée des pourcentages pondéraux)
- 4** : Axe principal des abscisses (unités Φ).
- 5** : Axe secondaire des abscisses (unités en μm)

Pour une meilleure caractérisation des sédiments, différents paramètres de distribution peuvent être utilisés (Buchanan, 1984) :

- *Le premier quartile Q1* (en μm ou en unités Φ) : correspond au diamètre égal à celui de 25% des grains.
- *La médiane Md ou deuxième quartile Q2* (en μm ou en unités Φ) : correspond au diamètre égal à celui de la moitié pondérale des grains.
- *Le troisième quartile Q3* (en μm ou en unités Φ) : correspond au diamètre égal à celui de 75% des grains.
- *Le taux de pérites* : correspond au pourcentage de particules fines dans le sédiment total.

A partir des valeurs de Q1 et Q3, l'indice de classement (indice de Trask = S_0) est calculé selon la formule (Buchanan, 1984) :

$$S_0 = (Q_3 - Q_1)/2.$$

Une faible valeur de cet indice indique une relative homogénéité dans la taille des grains (tableau 2). Le sédiment est alors qualifié de « bien classé » ou « très bien classé ». Une forte valeur indique un sédiment présentant un mélange de différentes catégories sédimentaires.

Tableau 2 : Interprétation des valeurs de l'indice de Trask

S_0	Sédiment
< 0,35	Très bien classé
0,35 – 0,50	Bien classé
0,50 – 0,71	Relativement bien classé
0,71 – 1,00	Moyennement classé
1,00 – 2,00	Mal classé
2,00 – 4,00	Très mal classé

Ces différents résultats figurent dans un tableau récapitulatif pour tous les sites.

3.1.2.- Matière organique

Chaque échantillon récolté subit le traitement décrit dans la partie méthodologie.

Le taux de matière organique est estimé par différence entre le poids mesuré après séchage à l'étuve, et celui obtenu après passage au four. Les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport au poids total de sédiment analysé. Pour chaque échantillon (un échantillon par station), trois mesures sont réalisées afin d'obtenir un taux de matière organique moyen et son écart-type. Les résultats pour tous les sites sont présentés sous forme de graphiques (figure 4).

Exemple d'illustration des résultats obtenus par l'analyse de la matière organique des sédiments :




Figure 4 : Taux de matière organique moyen (et écart-type) pour chaque site étudié (classés de nord au sud).

1 : Titre du graphique et année considérée

2 : Axe principal des ordonnées (pourcentage du poids total)

3 : Axe principal des abscisses (sites échantillonnés)

3.1.3.- Richesse spécifique et Abondance

Après dépouillements et analyses en laboratoire, les données de macrofaune (espèces et abondances associées) sont regroupées dans un tableau des abondances brutes (tableau 3).

Tableau 3 : Tableau des abondances brutes pour un site donné et pour l'année considérée.

	Site X								
	Station A			Station B			Station C		
Espèces	réplicat 1	réplicat 2	réplicat 3	réplicat 1	réplicat 2	réplicat 3	réplicat 1	réplicat 2	réplicat 3
Espèce 1	N I.A1	N I.A2	N I.A3	N I.B1	N I.B2	N I.B3	N I.C1	N I.C2	N I.C3
...									
Espèce i	N i.A1								N i.C3
total	A XA1	A XA2	A XA3	A XB1	A XB2	A XB3	A XC1	A XC2	A XC3
Nb d'esp	S XA1	S XA2	S XA3	S XB1	S XB2	S XB3	S XC1	S XC2	S XC3

A partir de ce tableau de données brutes, il est possible de calculer deux paramètres qui serviront à estimer la richesse spécifique moyenne et l'abondance moyenne :

- le nombre d'espèces S présentes dans chaque répliat
- l'abondance A exprimée en nombre d'individus par répliat

En complément, le nombre d'individus récoltés pour chaque espèce dans un site est totalisé ainsi que la fréquence de présence de chaque espèce dans les répliat.

La richesse spécifique (S)

Le tableau 3 donne S = nombre total d'espèces présentes dans un répliat.

La richesse spécifique moyenne (exprimée en nombre moyen d'espèces par répliat) est calculée sur l'ensemble du site en considérant tous les répliat de ce site. Les résultats pour tous les sites sont présentés sous forme de graphique (figure 5).

Exemple d'illustration des résultats obtenus pour la richesse spécifique des différents sites :




Figure 5 : Richesse spécifique moyenne (et écart-type) en 2004 pour tous les sites étudiés (classés du nord au sud).

1 : Titre du graphique et année considérée

2 : Axe principal des ordonnées (nombre moyen d'espèces par site)

3 : Axe principal des abscisses (sites échantillonnés)

L'abondance (A)

Le tableau 3 donne pour chaque réplikat l'abondance A_x = nombre total d'individus présents dans un réplikat.

L'abondance moyenne A (exprimée en nombre d'individus /m²) est calculée sur l'ensemble du site en considérant tous les réplikats de ce site, et ramenée au m². Les résultats pour tous les sites sont présentés sous forme de graphique (figure 6).

Exemple d'illustration des résultats obtenus pour l'abondance moyenne dans les différents sites :




Figure 6 : Abondance moyenne (et écart-type) en 2004 pour tous les sites étudiés (classés du nord au sud).

- 1** : Titre du graphique et année considérée
- 2** : Axe principal des ordonnées (nombre d'individus par m²)
- 3** : Axe principal des abscisses (sites échantillonnés)

3.1.4.- Groupes écologiques et coefficient benthique

Principe du calcul du coefficient benthique

Hily (1984) et Glémarec (1986) ont établi que la macrofaune benthique des sables fins peut être classée en cinq groupes dits écologiques (ou groupes écologiques de polluo-sensibilité), en fonction de leur sensibilité à un enrichissement en matière organique. Ces groupes sont présentés dans le tableau 4, selon les différentes classes définies par Grall & Glémarec (1997). Cette classification sert ensuite de base au calcul du coefficient benthique BC (Grall & Glémarec, 1997, Borja *et al*, 2000).

Tableau 4 : Groupes écologiques de polluo-sensibilité (d'après Grall & Glémarec, 1997)

Groupes écologiques	types d'espèce	Caractéristiques	Groupes trophiques dominants
I	<u>Espèces très sensibles</u> à un enrichissement	Présentes en conditions normales	Carnivores spécialisés, polychètes tubicoles déposivores
II	<u>Espèces indifférentes</u> à un léger enrichissement en matière organique	Toujours présentes, mais en faible densité	Suspensivores, carnivores moins sélectifs, nécrophages
III	<u>Espèces tolérantes</u> à un enrichissement en matière organique	Présentes sous conditions normales, se maintiennent à la suite d'enrichissement en M.O.	Déposivores tubicoles de surface
IV	<u>Espèces opportunistes</u> de second ordre	Se développent sous conditions d'enrichissement en M.O.	Déposivores de sub-surface
V	<u>Espèces opportunistes</u> de premier ordre	Prolifèrent dans les sédiments réduits (forts taux de M.O.)	Déposivores

Afin de calculer le coefficient benthique (BC), l'abondance relative de chaque groupe écologique par rapport à l'abondance totale dans chaque réplique est déterminée. Le calcul du coefficient benthique BC se fait ensuite selon la formule suivante (Grall & Glémarec, 1997 ; Borja *et al*, 2000) :

$$BC = [(0 \times \% GI) + (1,5 \times \% GII) + (3 \times \% GIII) + (4,5 \times \% GIV) + (6 \times \% GV)] / 100$$

L'indice biotique (BI) décrivant l'état de la communauté benthique du site étudié est évalué à partir de la valeur du coefficient benthique BC (Borja *et al.*, 2000). Les relations entre le coefficient benthique (BC) et l'indice biotique (BI) sont présentées dans le tableau suivant (tableau 5) :

Tableau 5: Relations entre BC, BI (selon Borja *et al.*, 2000) et l'état des communautés benthiques.

Coefficient Benthique BC	Indice Biotique BI	Groupe écologique dominant	État de la communauté benthique
$0.0 < BC \leq 0.2$	0	I	Normal
$0.2 < BC \leq 1.2$	1		Appauvrissement
$1.2 < BC \leq 3.3$	2	III	Déséquilibré
$3.3 < BC \leq 4.3$	3		Vers pollué
$4.3 < BC \leq 5.0$	4	IV-V	Pollué
$5.0 < BC \leq 5.5$	5		Vers très pollué
$5.5 < BC \leq 6$	6	V	Très pollué
non calculable	7	Azoïque	Azoïque

Application aux données REBENT

Les résultats concernant les groupes écologiques sont exprimés, pour chaque site, en pourcentages des abondances moyennés sur l'ensemble des réplicats du site et représentés sous la forme d'histogrammes empilés à 100% (figure 7).

Un coefficient benthique moyen (et son écart-type) est calculé à partir de l'ensemble des réplicats de chaque site. En complément de l'histogramme des groupes écologiques, le coefficient benthique BC est représenté pour chaque site sous forme d'un point associé à une double barre représentant l'écart-type (figure 7).

Exemple d'illustration des résultats obtenus pour les groupes écologiques dans les différents sites :




Figure 7 : Groupes écologiques et coefficient benthique (BC) avec son écart-type pour chaque site échantillonné (classés du nord au sud).

1 : Titre du graphique et année considérée

2 : Axe principal des ordonnées (histogramme empilé : pourcentage d'abondance des différents groupes écologiques)

3 : Axe secondaire des ordonnées (symbole et double barre : coefficient benthique BC et son écart-type)

4 : Axe principal des abscisses (sites échantillonnés)

3.1.5.- Les groupes trophiques

Pour compléter l'analyse de la structure du peuplement benthique, une classification en groupes fonctionnels basée sur l'alimentation peut être réalisée. Ainsi Grall & Glémarec (1997) ont défini 8 groupes trophiques particuliers (tableau 6).

Cette classification basée sur plusieurs critères dont l'origine ou l'état de la nourriture ingérée (animale, végétale, vivante, morte), pose toujours des problèmes pour certaines espèces dont on ne connaît pas encore précisément le régime alimentaire.

Tableau 6 : Classification des différents groupes trophiques et codes associés (d'après Grall & Glémarec, 1997)

Source alimentaire	Groupe trophique	Codes	Comportement trophique
Macrophages	Prédateurs ou carnivores	2	Chassent des proies mobiles ou sessiles
	Nécrophages	3	Mangeurs de chairs mortes (cadavres)
	Herbivores	4	Broutant les algues macrophytes
	Détritivores	5	Consomment les détritits essentiellement d'origine végétale
Microphages	Suspensivores	6	Liés aux apports de la couche sous-jacente
	Dépositivores sélectifs	7	Se nourrissent de particules organiques, supports de bactéries et d'algues unicellulaires, qui se déposent sur le sédiment
	Dépositivores non sélectifs	8	Ingèrent le sédiment dans lequel ils prélèvent la matière organique
	Brouteurs	9	Brouteurs de microphytes, bactéries et détritits

Exemples d'espèces de chaque groupe trophique :

Groupe 2 (prédateurs carnivores) : *Inachus dorsettensis* (crustacé décapode),

Groupe 3 (nécrophages) : *Nassarius reticulatus* (mollusque gastéropode), *Pagurus bernhardus* (crustacé décapode),

Groupe 4 (herbivores) : *Paracentrotus lividus* (échinoderme échinide),

Groupe 5 (détritivores) : *Gammarus locusta* (crustacé amphipode),

Groupe 6 (suspensivores) : *Phaxas pellucidus* (mollusque bivalve),

Groupe 7 (dépositivores sélectifs) : *Polydora antennata* (annélide polychète), *Abra alba* (mollusque bivalve),

Groupe 8 (dépositivores non sélectifs) : *Pectinaria koreni* (annélide polychète), *Echinocardium cordatum* (échinoderme échinide),

Groupe 9 (brouteurs) : *Gibbula magus* (mollusque gastéropode).

La fréquence relative basée sur les abondances dans les répliquats de chacun de ces groupes au sein des peuplements permet d'estimer quels types de régimes dominant la chaîne alimentaire.

Les résultats des groupes trophiques sont exprimés en pourcentage des abondances des groupes trophiques pour chaque site échantillonné et représentés sous forme d'histogrammes empilés à 100% (figure 8).

Exemple d'illustration des résultats obtenus pour les groupes trophiques des différents sites :




Figure 8 : Groupes trophiques (GT) en pourcentage des abondances pour chaque site (classés du nord au sud).







1 : Titre du graphique et année considérée

2 : Axe principal des ordonnées (histogramme empilé des pourcentages des abondances des groupes trophiques)

3 : Axe principal des abscisses (sites échantillonné)

3.2.- Analyse sédimentologique pour l'année 2009

3.2.1.- Analyse granulométrique






Figure 9 : Courbe granulométrique cumulée et pourcentages pondéraux des fractions granulométriques (avec écart-type) pour chaque site étudié, classé du nord au sud.

Afin de caractériser la composition sédimentaire de chaque site, différents paramètres ont été pris en compte. Ils sont présentés dans le tableau 7.

Tableau 7 : Récapitulatif des différents paramètres granulométriques pour chaque site étudié.

Sites	1 ^{er} Quartile (Q ₁)	Médiane (Q ₂)	2 ^{ème} Quartile (Q ₃)	S ₀ = (Q ₃ -Q ₁)/2	Taux de pélites (%)
<i>Saint-Brieuc</i>	0,49	2	3	1,4	8,31
<i>Lannion</i>	1,49	2,47	3	0,75	11,32
<i>Pierre Noire</i>	2,47	2,47	3	0,76	15,21
<i>Brest</i>	2	3,47	3,99	0,99	41,13
<i>Douarnenez</i>	2	2,47	3	0,5	3,13
<i>Audierne</i>	2,47	2,47	3	0,3	1,98
<i>Concarneau</i>	2	3	3,47	0,73	19,08
<i>Lorient</i>	1,49	2,47	3	0,76	3,49
<i>Quiberon</i>	1,49	2	2,47	0,98	10,17
<i>Vilaine</i>	2	3	3,99	0,99	26,61

Globalement, les caractéristiques granulométriques de tous les sites échantillonnés placent leurs sédiments dans la même catégorie des *sédiments sableux plus ou moins envasés* présentant des différences en termes de taux de particules fines, et de présence de sédiments grossiers.

Les valeurs de l'indice de classement (S₀) varient de 0,3 à 1,4, correspondant à des sédiments qualifiés de « très bien classés » à « mal classés ».

Au vu de ces résultats, les sites sont majoritairement « moyennement bien » classés (7 sites sur 10), leurs médianes variant de 2 à 3.

Un site (Audierne) est qualifié de « très bien classé » ; et Douarnenez peut être qualifié de « bien classé ».

Seul le site de Saint-Brieuc est « mal classé », avec une médiane de 2 (donc proches de celles du premier groupe).

La proportion de pélites varie de 3,13% à 41,13% selon les sites, opposant deux sites caractéristiques des sables propres (Douarnenez port et Audierne) à des sites caractéristiques des fonds de vases sableuses (Concarneau, Baie de Vilaine et Brest). Seul un site montre un taux supérieur à 30% (Brest). Les résultats obtenus pour le site de Lorient sont à nuancer, en effet une des stations échantillonnées présente une granulométrie très différente du faciès attendu (sable grossier à gravier).

Toutes ces données sont récapitulées dans un tableau (tableau 8) :

Tableau 8 : Caractéristiques granulométriques des sites échantillonnés en 2009.

Sites	Médiane (μm)	S ₀	% pélites	Mode dominant (μm)
<i>Saint Brieu</i>	355	Mal classé	8,31	1000
<i>Lannion</i>	125	Moyennement classé	11,32	90
<i>Pierre Noire</i>	250	Moyennement classé	15,21	180
<i>Brest</i>	250	Moyennement classé	41,13	< 63
<i>Douarnenez</i>	250	Bien classé	3,13	250
<i>Audierne</i>	180	Très Bien classé	1,98	180
<i>Concarneau</i>	180	Moyennement classé	19,08	125
<i>Lorient</i>	250	Moyennement classé	3,49	180
<i>Quiberon</i>	355	Moyennement classé	10,17	250
<i>Vilaine</i>	180	Moyennement classé	26,61	< 63

3.2.2.- Matière organique

Les taux moyens de matière organique mesurés dans chaque site pour l'année 2009 sont représentés sur la figure 10.

Taux de matière organique REBENT 2009




Figure 10 : Taux de matière organique moyen pour chaque site étudié en 2009 (classés du nord au sud).

Les taux de matière organique montrent un gradient de valeurs entre 1,2% (Audierne) et 6,3% (Brest), illustrant le gradient d'affinement sédimentaire (sables propres – vases sableuses) déjà décrit précédemment, mais restent globalement dans la même gamme.

3.3.- Composition spécifique pour l'année 2009

Importance relative des embranchements et grands groupes zoologiques

Les résultats sont présentés sous la forme de graphiques (figure 11) et d'un tableau récapitulatif (tableau 9).

Tableau 9 : Pourcentage des abondances des grands groupes zoologiques pour chaque site (les groupes dominants sont grisés). Le groupe Divers est constitué des Actinaria, Chordata, Nemerta, Phoronida, et Sipuncula.

taxon	Audierne	Baie de Vilaine	Brest	Concarneau	Douarnenez	Lannion	Lorient	Pierre Noire	Quiberon	Saint-Brieuc
Annelida	44,2	79,2	52,5	15,2	43,1	19,2	35,1	53,6	55,5	79,4
Crustacea	8,4	2,9	2,8	3,7	16,5	16,7	14,0	30,4	32,9	13,8
Echinodermata	9,5	9,5	6,4	13,0	3,2	45,0	19,6	2,2	4,1	
Mollusca	21,1	3,4	32,4	67,3	28,9	19,2	28,2	12,9	6,8	4,5
Divers	16,8	5	5,9	0,8	8,3		3,1	0,9	0,7	2,3

Si l'on considère l'ensemble des sites (tableau 9), ce sont les annélides polychètes (40% des abondances totales) qui dominent globalement le peuplement des sables fins envasés, puis les mollusques (30 %), les crustacés et échinodermes sont plus faiblement représentés (14 et 9% du peuplement).

Si l'on examine les dominances par site (tableau 9 et figure 11), on note que ce sont encore les annélides polychètes qui dominent globalement le peuplement des sables fins envasés avec une dominance dans huit sites sur dix, les mollusques sont dominants pour le site de Concarneau, et les mollusques à Lannion.




Figure 11 : Dominance des grands groupes zoologiques dans chaque site échantillonné en 2009.

Dominance relative des espèces

Si l'on considère les 20 premières espèces classées par ordre décroissant d'abondance dans chaque site, on note qu'il se dégage un petit nombre d'espèces communes qui constitue le noyau d'espèces communes dominantes du peuplement des sables fins envasés. Les plus fréquentes de ces espèces (c'est à dire communes dans plus de cinq sites) sont présentées dans le tableau 10 : on y retrouve la place importante des espèces de polychètes (5 espèces). Un seul genre de crustacé (*Ampelisca*) y est représenté. Une seule espèce de mollusque est commune à quatre sites.

Tableau 10 : Espèces communes dominantes (embranchement et fréquence d'apparition).

Embranchement	Espèce	Fréquence d'apparition
Annelida	<i>Nephtys hombergii</i>	9/10
Annelida	<i>Ampharete acutifrons</i>	6/10
Annelida	<i>Notomastus latericeus</i>	6/10
Annelida	<i>Hyalinoecia bilineata</i>	5/10
Annelida	<i>Scoloplos armiger</i>	5/10
Crustacea	<i>Ampelisca sarsi</i>	5/10
Crustacea	<i>Ampelisca armoricana</i>	5/10
Crustacea	<i>Ampelisca brevicornis</i>	5/10
Mollusca	<i>Phaxas pellucidus</i>	4/10

3.4.- Richesse spécifique et Abondance pour l'année 2009

3.4.1.- Richesse spécifique

La richesse spécifique moyenne (tableau 11) varie entre 6,4 ($\pm 2,4$) espèces par réplicat pour Audierne et 34,3 ($\pm 6,1$) espèces par réplicat pour Pierre Noire. Néanmoins, les valeurs de richesse spécifique restent sensiblement équivalentes entre les différents sites échantillonnés (figure 12).

Tableau 11 : Richesse spécifique moyenne (et écart-type) par site.

Sites	Richesse spécifique (nb moyen d'espèces)
Saint-Brieuc	21,3 \pm 3,7
Lannion	12,5 \pm 2,6
Pierre Noire	34,3 \pm 6,1
Brest	29,4 \pm 9,3
Douarnenez	13,5 \pm 3,4
Audierne	6,4 \pm 2,4
Concarneau	25,8 \pm 5,8
Lorient	23,2 \pm 9,9
Quiberon	32,3 \pm 10,3
Baie de Vilaine	14,7 \pm 6,6




Figure 12 : Richesse spécifique moyenne (nombre moyen d'espèces par réplicat) avec l'écart-type pour chaque site échantillonné en 2009 (classé du nord au sud).

3.4.2.-Abondance

Les abondances moyennes par site figurent dans le tableau 12 et sont présentées dans la figure 13.

Tableau 12 : Abondance moyenne (avec écart-type) par site

Sites	Abondance moyenne (nb ind/m ²)
Saint-Brieuc	588,8 ± 207,8
Lannion	353,3 ± 149,2
Pierre Noire	1249 ± 339,3
Brest	1192,25 ± 569,4
Douarnenez	242,2 ± 80,1
Audierne	105,55 ± 80,1
Concarneau	2754,4 ± 781,8
Lorient	690 ± 568,2
Quiberon	1437,7 ± 457,9
Baie de Vilaine	422,2 ± 291,8

On note que l'abondance moyenne varie entre un minimum de 242,2 (± 80,1) ind. /m² pour Audierne et un maximum de 1437,7 (±457,9) ind. /m² pour Quiberon.

Abondance moyenne par site




Figure 13 : Abondance moyenne (nombre moyen d'individus par m²) et écart-type en 2009 pour chaque site échantillonné (sites classés du nord au sud).

Il existe donc une certaine variabilité de la richesse spécifique et de l'abondance entre les sites, représentative des différences sédimentaires, mais néanmoins la majorité des sites présentent des valeurs de richesse et d'abondance relativement proches, dans une gamme habituelle pour ce type de peuplement ; seul le site d'Audierne reste à part avec de faibles valeurs d'abondance.

3.5.- Structure écologique pour l'année 2009

La structure écologique de chaque site (pourcentages d'abondance de chaque groupe), ainsi que le coefficient benthique (BC) sont représentés sur la figure 14.




Figure 14 : Groupe écologique et coefficient benthique (BC) pour chaque site échantillonné (sites classés du nord au sud). Calculs effectués à partir des groupes de références sur le site AZTI (décembre 2007)

Les proportions de chaque groupe écologique, ainsi que les valeurs du coefficient benthique sont présentées dans le tableau 13.

Tableau 13 : Pourcentage d'abondance des groupes écologiques et coefficient benthique (BC) et indice biotique (BI) associé. (Les groupes dominants sont grisés).

GE %	I	II	III	IV	NI	BC moyen	ET	BI
Saint-Brieuc	21,3	25,7	22,8	30,2	0	2,4	0,4	2
Lannion	76,7	14,8	4,1	3,5	0,9	0,5	0,2	1
Pierre Noire	38	23,8	29,2	9	0,1	1,7	0,3	2
Brest	32,6	24,5	29,8	12	1	1,8	0,3	2
Douarnenez	43,6	18,3	20,6	17	0,5	1,6	0,4	2
Audierne	17,9	37,9	43,2	0	1,1	1,8	0,4	2
Concarneau	18,1	14	66	1,7	0,2	2,2	0,2	2
Lorient	43	24,3	21,7	8,5	2,4	1,3	0,3	2
Quiberon	70,6	17,8	8,4	3	0,2	0,7	0,3	1
Baie de Vilaine	23,7	12,1	20,8	5	38,4	1,3	0,5	2

Le groupe écologique I domine pour les sites de Lannion, Pierre Noire, Brest, Douarnenez, Lorient et Quiberon avec des pourcentages oscillant entre 38% (Pierre Noire) et 70,6% (Quiberon). Pour les sites Audierne et Concarneau (respectivement 43,2 et 66% du peuplement), le groupe écologique II est dominant. Le groupe IV est prépondérant pour le site de Saint-Brieuc uniquement (35,7 % du peuplement). Le site de Baie de Vilaine est largement dominé (à plus de 35 %) par un polychète *Euclymene santandarensis*, pour lequel aucun groupe écologique n'a encore été assigné.

Le coefficient benthique (BC) varie entre 0,5 pour Lannion et 2,4 pour Saint-Brieuc. A partir du calcul du coefficient benthique BC, l'indice biotique (BI) peut être déduit : il varie entre 1 et 2 pour tous les sites étudiés.

3.6.- Structure trophique pour l'année 2009

Pour chaque site, les différents groupes trophiques sont représentés dans la figure 15.




Figure 15 : Groupes trophiques en pourcentage d'abondance pour chaque site échantillonné en 2009 (sites classés du nord au sud).

Les proportions des différents groupes trophiques figurent dans le tableau 14, avec les groupes dominants notés en gras.

Tableau 14 : Pourcentage d'abondance des groupes trophiques pour chaque site

GT	Saint-Brieuc	Lannion	Pierre Noire	Brest	Douarnenez	Audierne	Concarneau	Lorient	Quiberon	Baie de Vilaine
2	26	17,3	22,6	26,8	31,2	42,1	4,8	28	14,6	20,5
3	2,3	2,2	0,2	1,1	1,8	2,1	0,1	0,2	1,9	
4									0,3	
5	4,2	0,3	1,0	1,1			0,6	0,3	7,9	1,1
6	11,1	67	37,1	37	38,5	21,1	24,4	41,5	28,4	52,6
7	40,6	12,6	35,3	14,3	25,2	32,6	67,9	26,9	43,7	10
8	15,8	0,6	3,8	18,7	3,2	2,1	2,2	3,1	3,2	15,8
9				0,9						

Les groupes trophiques 6 (suspensivores) et 7 (dépositivores sélectifs) sont majoritairement dominants sur l'ensemble des sites. Ainsi pour Saint-Brieuc, Concarneau et Quiberon le groupe trophique 7 représente plus de 40 % du peuplement, et le groupe 6 plus de 35 % pour les sites de Lannion, Pierre Noire, Brest, Douarnenez et Lorient. Seul le site d'Audierne est dominé par le groupe trophique 2 (prédateurs).

Bien que non dominant, le groupe 2 (prédateurs ou carnivores) représente en moyenne plus de 15 % des pourcentages d'abondance des groupes trophiques, à l'exception de Concarneau (4.8% du peuplement).

4.-Commentaires généraux

Le suivi stationnel des sédiments meubles sublittoraux apporte des informations intéressantes sur la biodiversité des peuplements de sables fins sublittoraux côtiers autour de la Bretagne, élément majeur dans le fonctionnement des écosystèmes côtiers.

Les résultats acquis au titre du réseau de surveillance REBENT pour l'année 2009 montrent que les douze sites échantillonnés ont des caractéristiques sédimentologiques et benthiques qui les relient nettement au peuplement des sables fins plus ou moins envasés ; elles peuvent être résumées ainsi :

Variabilité des paramètres abiotiques édaphiques

Des paramètres abiotiques édaphiques que sont la granulométrie et le taux de matière organique (Tableau 14), c'est le premier qui montre le plus de variabilités pour différencier les sites. Ainsi on peut discerner quelques différences séparant les sites suivis :

- Les sites sont majoritairement « moyennement » classés (7 sites sur 10), avec un mode dominant entre les pélites (Vilaine et Brest) et les sables fins (Quiberon). Le taux moyen de pélites pour ces sites est de 18,14 %, mais il varie sur une large gamme (de 3,49 % pour Lorient à 41,13 % à Brest). Ces sites sont caractéristiques des sédiments hétérogènes envasés, avec les sites de Brest et Vilaine représentant des sables fins hétérogènes envasés caractérisés par un indice de classement fort (indice $S_o \sim 1$).
- Seuls les sites d'Audierne et de Douarnenez sont « bien » à « très bien » classés, avec un taux de pélites inférieur à 3,5% et un mode dominant dans les sables fins. Ce sont des sables qualifiés de propres ou très peu envasés.
- Le seul site mal classé est le celui de Saint-Brieuc, caractérisé par un mode dominant dans les sables grossiers, avec un taux de pélites inférieur à 10 %.

Au total, on peut remarquer que les dix sites représentent bien le gradient habituel de variations des paramètres édaphiques des peuplements de sables fins plus ou moins envasés, sans que la gamme soit trop importante pour induire de trop fortes différences dans les caractéristiques faunistiques.

Aspects structuraux et quantitatifs

Composition faunistique

Si l'on tient compte de l'importance des grands groupes zoologiques dans l'ensemble des sites, ce sont le groupe des annélides polychètes qui dominent le peuplement, avec près de 42 % des abondances. Cette dominance est à peu près similaire pour la plupart des sites sauf Lannion et Concarneau dominés respectivement par les échinodermes et les mollusques.

En considérant les 20 premières espèces classées dans chacun des sites, il se dégage un petit nombre d'espèces communes entre une majorité de sites qui forme le noyau d'espèces dominantes du peuplement. On y retrouve évidemment une majorité d'annélides polychètes (5 espèces), puis trois espèces de crustacés du même genre (*Ampelisca*), et une de mollusque.

Richesse spécifique

Les résultats obtenus montrent que la richesse spécifique moyenne par site varie entre 6,4 (pour le site d'Audierne) et 34,3 espèces (pour le site de Pierre Noire).

D'une façon générale, on peut noter que les valeurs de richesse spécifique moyenne restent dans une gamme des variabilités habituelles du peuplement des sédiments sableux côtiers sublittoraux.

Abondance

Pour l'année 2009, les abondances moyennes par site varient entre 105 individus par m² (Audierne) et 14 437 individus par m² (Quiberon). Mise à part la faible valeur d'Audierne, toutes les autres valeurs sont supérieures à 200 individus par m².

Ainsi, de même que pour la richesse spécifique moyenne, la gamme des valeurs obtenues pour l'abondance moyenne se situe dans les variabilités habituelles connues pour ce type de peuplement.

Groupes écologiques

Groupes écologiques de polluo-sensibilité, et coefficient benthique

On observe que le groupe écologique I, constitué d'espèces sensibles à une hypertrophisation, domine dans six sites sur dix. Ces espèces sont habituellement majoritaires dans le milieu sous conditions normales, et elles disparaissent en premier lors d'un enrichissement en matière organique du milieu (Hily, 1984).

Le groupe III est dominant pour les sites d'Audierne et Concarneau. Pour ces sites, hormis Concarneau, il ne se dégage pas de dominance particulière d'un groupe trophique par rapport aux autres.

Le site de Saint-Brieuc est dominé par un ensemble d'espèces appartenant au groupe écologique IV, constitué d'espèces opportunistes de second ordre, dont les polychètes cirratulidae représentent 33% du peuplement. Néanmoins, les proportions des autres groupes évoluent dans une gamme similaire.

Les résultats de calcul des groupes écologiques de polluo-sensibilité, et de coefficient benthique montrent que les sites échantillonnés dans le peuplement des sables fins plus ou moins envasés présentent globalement un indice biotique de 1 ou 2, sans qu'il soit possible de détecter des perturbations majeures dans la composition qualitative et quantitative de ce peuplement.

Groupes trophiques

De même l'examen des résultats de la structure trophique des différents sites montre que la plupart des sites sont dominés par les espèces de type dépositives sélectif (dépositives de surface) ce qui ne permet pas de déceler actuellement des états fortement perturbés du peuplement.

Seul le site d'Audierne est dominé par les groupes trophiques 2 et 7. Il faut toutefois relativiser ces résultats. Audierne montre une faible abondance (avec dans certains répliquats une absence totale de faune), et l'espèce dominante (à plus de 40%) est *Edwardsia claparedii* appartenant au groupe trophique 2 (prédateurs).

En résumé :

Les résultats obtenus dans les différents sites échantillonnés pour l'année 2008 sont globalement caractéristiques du peuplement sublittoral des sables fins envasés côtiers, ils illustrent la diversité des faciès liés essentiellement aux caractères particuliers des sites et notamment de leurs paramètres sédimentologiques.

Les variabilités inter-sites en termes de richesse et composition spécifique, et d'abondance moyenne sont de l'ordre de celles que l'on connaît dans ce type de peuplement sur les côtes nord-européennes.

L'évaluation de perturbations possibles sur ces aspects structuraux et quantitatifs (composition, abondance, dominance, groupes écologiques et trophiques, ...) du peuplement des sables fins envasés des côtes bretonnes ne permet pas de les discerner dans cette série de prélèvements. Il est prévu une analyse comparative sur les cinq premières années afin d'évaluer de possibles variations temporelles.

Références bibliographiques

Augris C. Hamon D. (édit.), 1996.- *Atlas thématique de l'environnement marin en Baie de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor)*, Éditions IFREMER., 72 pp., 20 cartes.

Borga A., Franco J., Perez V., 2000.- A Marine Biotic Index to establish the ecological quality of soft-bottom benthos within European estuarine and coastal environments. *Marine Pollution Bulletin*, 40: 1100 – 1114.

Buchanan J.B., 1984. - Sediment analysis. In, Holme N.A., McIntyre A.D. (edit). *Methods for the study of marine benthos*. IBP hand book 16, Blackwell scientific publication, Oxford, 41-65.

Cabioch L., 1961.- Étude de la répartition des peuplements benthiques au large de Roscoff. *Cahiers de Biologie marine*, 2 : 1-40.

Cabioch L., 1968.- Contribution à la connaissance des peuplements benthiques de la Manche occidentale. *Cahiers de Biologie marine*, :9, 493-720.

Cabioch L., Gentil F., Glaçon R., Retière C., 1977.- Le macrobenthos des fonds meubles de la Manche : distribution générale et écologie. In Keegan B., O'Ceidigh P., Boaden (eds). *Biology of marine organisms*, Pergamon Press, 115-128.

Chassé C., Glémarec M., 1976 - Atlas des fonds meubles du plateau continental du Golfe de Gascogne. *Cartes biosédimentaires* ; Feuille de Brest, Pont-Croix, Quimper, Lorient et Vannes. Imprimerie ICA, Brest.

Crisp D.J., 1984. - Energy flow measurements. In, Holme N.A., McIntyre A.D. (eds), *Methods for the study of marine benthos*. IBP hand book 16, Blackwell scientific publication, Oxford, 284-372.

Dauvin J.-C., 1979.- *Recherches quantitatives sur les peuplements des sables fins de la Pierre Noire, baie de Morlaix, et sur sa perturbation par les hydrocarbures de l'Amoco-Cadiz*. Thèse de 3^{ème} cycle, Océanographie Biologique. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 251 pp.

Dauvin J.-C., 1984.- *Dynamique d'écosystèmes macrobenthiques des fonds sédimentaires de la baie de Morlaix et leur perturbation par les hydrocarbures de l'Amoco Cadiz*. Thèse Doctorat État, Sciences Naturelles, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 468 pp et annexes 193 pp.

Dauvin J.C., 1996.- Le macrobenthos marin : témoin des variations de l'environnement côtier. *RNO 1996.- Surveillance du Milieu Marin. Travaux du RNO*. Édition 1996. IFREMER et Ministère de l'Environnement. 9-20.

Dauvin J.-C. (édit.), 1997.- *Les biocénoses marines et littorales françaises des côtes Atlantique, Manche et Mer du Nord, synthèse, menaces et perspectives*. Laboratoire de Biologie des Invertébrés Marins et Malacologie- Service du Patrimoine naturel/ IEBG/ Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 376 pp.

Gentil F., Dauvin J.-C., 2000.- Le macrobenthos marin : témoin des variations de l'environnement côtier. Le suivi des peuplements benthiques de la Baie de Morlaix dans le cadre de la surveillance des effets biologiques du RNO (Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin). *Actes du colloque RNO : 25 ans de surveillance du milieu marin*. 27-28 octobre 1999, Nantes, éditions IFREMER , 45-55.

Gentil F., Cabioch L., 1997.- Les biocénoses subtidales macrobenthiques de la Manche, conditions écologiques et structure générale. In, Dauvin J.-C. (édit.), *Les biocénoses marines et littorales françaises des côtes Atlantique, Manche et Mer du Nord, synthèse, menaces et perspectives*. Laboratoire de Biologie des Invertébrés Marins et Malacologie- Service du Patrimoine naturel/ IEBG/ Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 68-78.

Glémarec M., 1964.- Bionomie benthique de la partie orientale du golfe du Morbihan. *Cahiers de Biologie marine*, 5 : 33-96.

Glémarec M., 1969. *Les peuplements benthiques du plateau continental Nord-Gascogne*. Thèse de doctorat État, Sciences Naturelles, Faculté des sciences de Paris, Brest, 167 pp.

Glémarec M., 1973. - The benthic communities of the European North Atlantic continental shelf. *Oceanography & Marine Biology Annual Review*, 11 : 263 – 289.

Glémarec M., 1978.- Distribution bathymétrique et latitudinale des bivalves du Golfe de Gascogne. *Haliotis*, 9: 45 – 48.

Glémarec M., 1986. - Ecological impact of an oil-spill: utilisation of biological indicators. IAWPRC-NERC Conference, July 1985. *IAWPRC Journal*, 18: 203 – 211.

Grall J., Glémarec M., 1997. - Using biotic indices to estimate macrobenthic community perturbations in the Bay of Brest. *Estuarine, Coastal and shelf Science*, 44 : 43 – 53.

Hily C., 1984.- *Variabilité de la macrofaune benthique dans les milieux hypertrophiques de la Rade de Brest*. Thèse de doctorat d'État, Sciences Naturelles., Université de Bretagne Occidentale, Brest, Vol I & II, 359 pp.

Hily C., Grall J., 2003.- Traitement des données stationnelles (faune). Fiche technique REBENT n° 10 (FT-10-2003-01.doc). site internet :www.rebent.org

Guillaumont B., Hamon D., Hily C., 2001.- Réseau benthique (REBENT): développement d'un pilote breton. Élaboration de l'avant-projet sommaire (APS). Rapport technique IFREMER RST.DEL, Brest, 112 pp. et annexes.

Larsonneur C.- 1971.- *Manche Centrale et baie de Seine : géologie du substratum et des dépôts meubles*. Thèse de Doctorat d'État ès Sciences Naturelles, Université de Caen, 394 pp.

Larsonneur C.- 1977.- La cartographie des dépôts meubles sur le plateau continental français, méthode mise au point et utilisée en Manche. *Journal de Recherche océanographique*, 2 : 33-39.

Menesguen A., 1980. *La macrofaune benthique de la baie de Concarneau. Peuplements, dynamique de populations, prédation exercée sur les poissons*. Thèse de 3^{ième} cycle, océanographie biologique, Université de Bretagne Occidentale, 127 pp.

Noël P., Blanchard M., Berthou P., 1995. - Cartographie et évaluation des principaux mollusques filtreurs du golfe normanno-breton. Rapport IFREMER DEL/95 11 et DRV/RH Brest, 31 pp.

Retière C., 1979.- *Contribution à la connaissance des peuplements benthiques du golfe Normano-Breton*. Thèse de Doctorat d'État ès Sciences Naturelles, Université de Rennes, 421 pp.

Toulemont A., 1972.- Influence de la nature granulométrique des sédiments sur les structures benthiques. Baies de Douarnenez et d'Audierne (Ouest-Finistère). *Cahiers de Biologie marine*, 13 : 91-136.

Vaslet D., Larsonneur C., Auffret J.-P., 1978.- *Carte des sédiments superficiels de la Manche au 1/500 000 et notice*. B.R.G.M. édit., Orléans.